



XIV  
**Congreso Nacional**  
**AETAPI**  
**12,13, 14 y 15 DE NOVIEMBRE**  
**Bilbao/San Sebastián 2008**



XIV Congreso Nacional de Autismo - Bilbao - San Sebastián - 12, 13, 14 y 15 de Noviembre 2008

## Presentación comunicación

Fecha 15-06-08

Título completo de la Comunicación/panel/vídeo:	ESTUDIO DE MEDIDAS PARA LA VALORACIÓN DE TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA EN PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL SEVERA Y PROFUNDA
Tema	Adultos con autismo
Resumen del contenido	<p><b>INTRODUCCIÓN.</b>          El presente trabajo surge de la necesidad de hacer una exploración y evaluación adecuadas de TEA para las personas adultas con discapacidad intelectual severa y profunda (DISP). Una gran parte de ellas no han recibido nunca un diagnóstico clínico de autismo o TEA. La ausencia de pruebas adaptadas para estas edades y niveles tan reducidos de funcionamiento intelectual dificulta una evaluación y diagnóstico precisos de TEA en estos casos.</p> <p><b>PLANTEAMIENTO.</b>          A partir de los criterios clínicos diagnósticos del DSM-IV-TR se establecen dos grupos iniciales para el estudio: un grupo clínico con TEA y DISP y un grupo control con DISP sin TEA. A todos los participantes se les administran las pruebas CARS e ICAP. Se pretende analizar la presencia de diferencias significativas entre el grupo clínico y el grupo control en relación a las puntuaciones totales y a ítems o áreas específicos de ambas pruebas.</p> <p><b>METODOLOGÍA</b>  <b>Descripción de la muestra.</b>          La muestra estuvo compuesta por 42 personas con discapacidad intelectual severa y profunda (DISP) residentes en la Residencia Marinada de Profundos de Reus. La media de edad fue de 36 años con un rango entre 22 y 64. El porcentaje de hombres y de mujeres fue del 50%, n=21 para cada grupo. Todos los participantes tuvieron un diagnóstico de Discapacidad Intelectual, de ellos, el 50 % en el nivel severo y el 50 % en el nivel profundo. En relación a los TEA, el 76,2 % recibieron un diagnóstico de Trastornos del Espectro Autista y el 23,8 % recibieron un diagnóstico de No Trastornos del Espectro Autista de acuerdo con los criterios clínicos del DSM-IV-TR.</p> <p><b>Variables.</b>          Las variables objeto de estudio fueron: edad cronológica, sexo, nivel de retraso mental y las medidas de la Conducta Adaptativa y de los Trastornos del Espectro Autista por medio de las pruebas ICAP y CARS, respectivamente.</p> <p><b>Análisis estadísticos.</b></p>

Enviar a: XIV CONGRESO Aetapi .E-mail: [info@aetapi-donostia.com](mailto:info@aetapi-donostia.com)

Se utilizan los estadísticos descriptivos para la obtención de medias y porcentajes en relación con la edad cronológica, sexo y nivel de retraso mental. Para la comparación de medias entre los grupos clínico y control en relación al ICAP y CARS se utilizó la prueba no paramétrica Mann-Whitney U.

#### Resultados

Se obtuvieron diferencias significativas entre el grupo clínico (DISP+TEA) y el grupo control (DISP+ No TEA) en relación con las puntuaciones totales del CARS ( $U=6$   $p=,000$ ). Asimismo, se obtuvieron diferencias significativas entre ambos grupos en todos los ítems del CARS. En relación al ICAP, se obtuvieron diferencias significativas en el área de Destrezas Sociales y Comunicativas del ICAP ( $U=68$   $p=,017$ ). No se obtuvieron diferencias significativas entre ambos grupos en relación a la Edad Cronológica. Para el grupo de participantes con DISP+TEA se obtuvieron diferencias significativas entre los dos niveles de DI, severo y profundo, en relación con los ítems Imitación ( $U=47$   $p=,001$ ) y Comunicación No verbal ( $U=33,5$   $p=,000$ ). Las diferencias en relación a la puntuación total del CARS tendieron a la significación ( $U=78,5$   $p=,064$ ). En relación al ICAP se obtuvieron diferencias significativas entre severos y profundos con TEA en todas las áreas de destrezas. Para el grupo de participantes con DISP Sin TEA no se obtuvieron diferencias significativas entre los niveles de DI severo y profundo en relación a la puntuación total del CARS ( $U=4,000$   $p=,086$ ).

#### CONCLUSIONES.

Se analiza la presencia de diferencias en los comportamientos y funcionamiento entre las personas adultas con DISP con y sin TEA. El establecimiento de un diagnóstico de TEA en estas edades y niveles de DI tan severos es complicado siendo necesario el diseño de instrumentos adaptados que nos permitan realizar un diagnóstico más preciso.

#### SISTEMA DE EVALUACIÓN. MATERIALES.

El diagnóstico clínico fue establecido a partir de los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR. La pruebas utilizadas fueron la Childhood Autism Rating Scale (Schopler E et al., 1988) para la evaluación de TEA y el Inventario para la Planificación de los Servicios y Conducta Adaptativa (Montero, D.,1993) como medida de la conducta adaptativa.

#### BIBLIOGRAFÍA.

- American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-IV-TR). Washington, DC: American Psychiatric Press; 2000
- Montero, D. (1993) Evaluación de la conducta adaptativa en personas con discapacidades. Adaptación y validación del ICAP. Bilbao: Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Deusto. [Tercera edición en Bilbao: Ediciones Mensajero, 1999]
- Schopler E, Reichler RJ, Devellis RF, Daly K. Toward objective classification of childhood autism: Childhood Autism Rating Scale (CARS). J Autism Dev Disord 1980;10:91–103.

Autores de la  
Comunicación/panel/vídeo

M<sup>a</sup> Inmaculada Planelles-Fernández, Nadia Ribò, Pilar Paisano, Mar Margalef, Carmen Serrano, Natalia Cristià, Montserrat Vilella.